

BRONCOFENIL

GUAIFENESINA

XAROPE: Frasco de vidro com 100 ml

USO ADULTO E INFANTIL

XAROPE – Cada 15 mL contém:

guaifenesina.....200 mg
sacarose, ciclamato de sódio, ácido cítrico, aroma artificial de groselha,
carboximetilcelulose, sacarina sódica, glicerol, benzoato de sódio,
metilparabeno, mentol, corante vermelho 40 e água purificada q.s.p. 15 ml

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

EXPECTORANTE

MODO DE AÇÃO: **BRONCOFENIL** apresenta propriedade expectorante das vias aéreas.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: este medicamento deve ser mantido bem fechado e armazenado à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

PRAZO DE VALIDADE: vide rótulo e cartucho. **ATENÇÃO:** não utilize o produto fora do prazo indicado, pois o efeito esperado poderá não ocorrer.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término.” “Informar ao médico se está amamentando.”

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO: “Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.”

INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO: “Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.”

“INFORME SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.”

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

“INFORME SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO, ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O TRATAMENTO.”

“NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Em função do componente ativo da fórmula, **BRONCOFENIL** apresenta propriedade expectorante das vias aéreas, sendo muito útil, isolada ou associadamente, no tratamento da tosse com catarro. Para facilitar a fluidificação do muco das vias aéreas, o usuário deve tomar um copo de água após a ingestão de cada dose do medicamento.

INDICAÇÕES: expectorante, no tratamento das traqueobronquites e suas manifestações, especialmente nos casos acompanhados de tosse com catarro.

CONTRA-INDICAÇÕES: hipersensibilidade individual aos componentes da formulação.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: não tome este medicamento em caso de tosse crônica como a causada por asma, bronquite crônica ou enfisema, ou se a tosse vier acompanhada de muco excessivo, a menos que indicado por um médico. Não exceder a dose recomendada. Consulte seu médico se a tosse persistir por mais de 5 dias, tender a reincidir, vier acompanhada de febre, erupções cutâneas, dor de garganta ou dor de cabeça persistente.

BRONCOFENIL não deve ser administrado a crianças com menos de 2 anos de idade, a menos que indicado pelo médico.

Diabéticos: Este produto contém açúcar.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não são conhecidas.

REAÇÕES ADVERSAS: a ocorrência de reações indesejáveis com o uso de **BRONCOFENIL** é pouco frequente.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Adultos e crianças maiores de 12 anos: 15 mL a cada 4 horas.

Crianças de 6 a 12 anos: 10 mL a cada 4 horas.

Crianças de 2 a 6 anos: 5 mL a cada 4 horas.

Crianças abaixo de 2 anos: siga recomendação médica.

Não exceder 6 doses por dia.

Em caso de esquecer uma dose, tome logo que possível, a menos que esteja perto da próxima dose. Não tome dose dupla.

SUPERDOSAGEM: em caso de ingestão acidental de altas doses deste medicamento, podem ocorrer sintomas como náuseas, diarreia, vômitos, dor de estômago, dor de cabeça, sonolência e vertigem. A conduta nos casos de superdosagem consiste na realização das medidas usuais de esvaziamento gástrico e controle sintomático.

PACIENTES IDOSOS: não existem recomendações especiais para pacientes idosos.

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.”

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Reg. MS – 1.0174.0049.001-3

Farm. Resp.: Daniela Ziolkowski

CRF-SP nº 29 486

ZURITA Laboratório Farmacêutico Ltda.

Rua Domingos Graziano, 104 – Araras – SP

CEP 13600-718

CNPJ nº 44.211.936/0001-37

Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor: 0800-17-2119

www.zurita.com.br